

# 安哥拉


人口总数: 20 821 000

收入分组: 中高


城市地区人口占比: 59.2%

30岁至70岁人口占比: 24.4%

## 年龄标准化死亡率\*





## 死因构成比 (占有所有死亡的%, 所有年龄组, 两性)\*



死亡总数: 301,000  
非传染性疾病估计占有所有死亡的 24%。

## 非传染性疾病导致的过早死亡\*

30岁至70岁期间死于4种主要的非传染性疾病的概率为 24%。



## 成人危险因素

	男性	女性	合计
目前吸烟(2011)	...	...	...
人均酒精总消费量, 纯酒精立升数(2010)	12.0	3.0	7.5
高血压(2008)	33.3%	27.4%	30.3%
肥胖症(2008)	3.5%	9.1%	6.4%

## 国家系统应对非传染性疾病

卫生部或同等部委设有科室/部门或司局负责非传染性疾病	ND
已实行针对多个非传染性疾病和共同危险因素的国家多部门政策、战略或行动计划	ND
已实行旨在减少有害使用酒精的政策、战略或行动计划	ND
已实行旨在减少缺乏运动和/或促进运动的政策、战略或行动计划	ND
已实行旨在减轻烟草使用负担的政策、战略或行动计划	ND
已实行旨在减少不健康饮食和/或促进健康饮食的政策、战略或行动计划	ND
已有通过初级保健方法管理主要非传染性疾病的国家循证指南/规程/标准	ND
已有能够报告9项全球非传染性疾病指标的非传染性疾病监测和监督系统	ND
有全国性以人口为基础的癌症登记	ND

\* 该国的死亡率估计具有高度不确定性, 这是因为没有以国家非传染性疾病死亡数据为基础 (见解释性说明)。  
... = 没有可用数据

ND = 国家没有对国家能力调查作出回应