

保加利亚


人口总数: 7 278 000

收入分组: 中高


城市地区人口占比: 73.1%

30岁至70岁人口占比: 55.8%

年龄标准化死亡率*





死因构成比 (占所有死亡的%, 所有年龄组, 两性)*



死亡总数: 106,000
非传染性疾病估计占所有死亡的 94%.

非传染性疾病导致的过早死亡*

30岁至70岁期间死于4种主要的非传染性疾病的概率为 24% .



成人危险因素

目前吸烟(2011)

男性 女性 合计

48% 31% 39%

人均酒精总消费量, 纯酒精升数(2010)

17.9 5.3 11.4

高血压(2008)

44.3% 39.5% 41.8%

肥胖症(2008)

23.1% 24.3% 23.7%

国家系统应对非传染性疾病

卫生部或同等部委设有科室/部门或司局负责非传染性疾病

DK

已实行针对多个非传染性疾病和共同危险因素的国家多部门政策、战略或行动计划

否

已实行旨在减少有害使用酒精的政策、战略或行动计划

否

已实行旨在减少缺乏运动和/或促进运动的政策、战略或行动计划

否

已实行旨在减轻烟草使用负担的政策、战略或行动计划

否

已实行旨在减少不健康饮食和/或促进健康饮食的政策、战略或行动计划

否

已有通过初级保健方法管理主要非传染性疾病的国家循证指南/规程/标准

是

已有能够报告9项全球非传染性疾病指标的非传染性疾病监测和监督系统

否

有全国性以人口为基础的癌症登记

是

* 该国的死亡率估计数具有高度不确定性, 这是因为没有以国家非传染性疾病死亡数据为基础 (见解释性说明).

DK = 国家回答“不知道”