

赤道几内亚


人口总数: 736 000

收入分组: 高


城市地区人口占比: 39.5%

30岁至70岁人口占比: 32.3%

年龄标准化死亡率*



死因构成比 (占有所有死亡的%, 所有年龄组, 两性)*




死亡总数: 8,900
非传染性疾病估计占有所有死亡的 31%。


非传染性疾病导致的过早死亡*

30岁至70岁期间死于4种主要的非传染性疾病的概率为 23%。

70岁以下死亡人数
男性



70岁以下死亡人数
女性



成人危险因素

	男性	女性	合计
目前吸烟(2011)
人均酒精总消费量, 纯酒精立升数(2010)	10.1	2.9	6.6
高血压(2008)	39.6%	32.5%	36.0%
肥胖症(2008)	7.3%	13.8%	10.6%

国家系统应对非传染性疾病

卫生部或同等部委设有科室/部门或司局负责非传染性疾病	否
已实行针对多个非传染性疾病和共同危险因素的国家多部门政策、战略或行动计划	否
已实行旨在减少有害使用酒精的政策、战略或行动计划	否
已实行旨在减少缺乏运动和/或促进运动的政策、战略或行动计划	否
已实行旨在减轻烟草使用负担的政策、战略或行动计划	否
已实行旨在减少不健康饮食和/或促进健康饮食的政策、战略或行动计划	否
已有通过初级保健方法管理主要非传染性疾病的国家循证指南/规程/标准	否
已有能够报告9项全球非传染性疾病指标的非传染性疾病监测和监督系统	否
有全国性以人口为基础的癌症登记	否

* 该国的死亡率估计数具有高度不确定性, 这是因为没有以国家非传染性疾病死亡数据为基础 (见解释性说明)。
... = 没有可用数据