


印度尼西亚


人口总数: 247 000 000
收入分组: 中低

城市地区人口占比: 50.7%
30岁至70岁人口占比: 42.6%

年龄标准化死亡率*




死因构成比 (占有所有死亡的%, 所有年龄组, 两性)*



非传染性疾病导致的过早死亡*

30岁至70岁期间死于4种主要的非传染性疾病的概率为 23% .



成人危险因素			
	男性	女性	合计
目前吸烟(2011)	67%	3%	35%
人均酒精总消费量, 纯酒精立升数(2010)	1.1	0.1	0.6
高血压(2008)	29.1%	26.6%	27.8%
肥胖症(2008)	2.6%	6.9%	4.8%

国家系统应对非传染性疾病	
卫生部或同等部委设有科室/部门或司局负责非传染性疾病	是
已实行针对多个非传染性疾病和共同危险因素的国家多部门政策、战略或行动计划	是
已实行旨在减少有害使用酒精的政策、战略或行动计划	是
已实行旨在减少缺乏运动和/或促进运动的政策、战略或行动计划	是
已实行旨在减轻烟草使用负担的政策、战略或行动计划	是
已实行旨在减少不健康饮食和/或促进健康饮食的政策、战略或行动计划	是
已有通过初级保健方法管理主要非传染性疾病的国家循证指南/规程/标准	是
已有能够报告9项全球非传染性疾病指标的非传染性疾病监测和监督系统	否
有全国性以人口为基础的癌症登记	否

* 该国的死亡率估计数具有高度不确定性, 这是因为没有以国家非传染性疾病死亡数据 为基础 (见解释性说明).