

吉尔吉斯斯坦


人口总数: 5 474 000

收入分组: 低


城市地区人口占比: 35.3%

30岁至70岁人口占比: 35.9%

年龄标准化死亡率




死因构成比 (占所有死亡的%, 所有年龄组, 两性)




非传染性疾病导致的过早死亡

30岁至70岁期间死于4种主要的非传染性疾病的概率为 28%。

70岁以下死亡人数
男性



70岁以下死亡人数
女性



成人危险因素

	男性	女性	合计
目前吸烟(2011)	45%	2%	23%
人均酒精总消费量, 纯酒精立升数(2010)	6.7	2.0	4.3
高血压(2008)	34.5%	31.1%	32.7%
肥胖症(2008)	10.9%	19.8%	15.5%

国家系统应对非传染性疾病

卫生部或同等部委设有科室/部门或司局负责非传染性疾病	否
已实行针对多个非传染性疾病和共同危险因素的国家多部门政策、战略或行动计划	是
已实行旨在减少有害使用酒精的政策、战略或行动计划	是
已实行旨在减少缺乏运动和/或促进运动的政策、战略或行动计划	是
已实行旨在减轻烟草使用负担的政策、战略或行动计划	是
已实行旨在减少不健康饮食和/或促进健康饮食的政策、战略或行动计划	是
已有通过初级保健方法管理主要非传染性疾病的国家循证指南/规程/标准	是
已有能够报告9项全球非传染性疾病指标的非传染性疾病监测和监督系统	否
有全国性以人口为基础的癌症登记	否