


圣卢西亚

人口总数: 181 000
收入分组: 中高

城市地区人口占比: 17.5%
30岁至70岁人口占比: 44.5%

年龄标准化死亡率*



死因构成比 (占有所有死亡的%, 所有年龄组, 两性)*



非传染性疾病导致的过早死亡*



成人危险因素

	男性	女性	合计
目前吸烟(2011)	...	...	...
人均酒精总消费量, 纯酒精立升数(2010)	15.1	5.9	10.4
高血压(2008)	35.1%	26.2%	30.5%
肥胖症(2008)	11.4%	30.8%	21.4%

国家系统应对非传染性疾病

卫生部或同等部委设有科室/部门或司局负责非传染性疾病	否
已实行针对多个非传染性疾病和共同危险因素的国家多部门政策、战略或行动计划	否
已实行旨在减少有害使用酒精的政策、战略或行动计划	否
已实行旨在减少缺乏运动和/或促进运动的政策、战略或行动计划	否
已实行旨在减轻烟草使用负担的政策、战略或行动计划	否
已实行旨在减少不健康饮食和/或促进健康饮食的政策、战略或行动计划	否
已有通过初级保健方法管理主要非传染性疾病的国家循证指南/规程/标准	否
已有能够报告9项全球非传染性疾病指标的非传染性疾病监测和监督系统	是
有全国性以人口为基础的癌症登记	否

*见解释性说明
... = 没有可用数据