

# 毛里塔尼亚


人口总数: 3 796 000

收入分组: 中低


城市地区人口占比: 41.5%

30岁至70岁人口占比: 30.5%

## 年龄标准化死亡率\*




## 死因构成比 (占所有死亡的%, 所有年龄组, 两性)\*



死亡总数: 30,000  
非传染性疾病估计占所有死亡的 32%.

## 非传染性疾病导致的过早死亡\*

30岁至70岁期间死于4种主要的非传染性疾病的概率为 16% .



## 成人危险因素

	男性	女性	合计
目前吸烟(2011)	29%	4%	17%
人均酒精总消费量, 纯酒精升数(2010)	0.2	0.0	0.1
高血压(2008)	32.9%	29.1%	30.9%
肥胖症(2008)	3.7%	21.7%	12.7%

## 国家系统应对非传染性疾病

卫生部或同等部委设有科室/部门或司局负责非传染性疾病	否
已实行针对多个非传染性疾病和共同危险因素的国家多部门政策、战略或行动计划	否
已实行旨在减少有害使用酒精的政策、战略或行动计划	否
已实行旨在减少缺乏运动和/或促进运动的政策、战略或行动计划	是
已实行旨在减轻烟草使用负担的政策、战略或行动计划	是
已实行旨在减少不健康饮食和/或促进健康饮食的政策、战略或行动计划	是
已有通过初级保健方法管理主要非传染性疾病的国家循证指南/规程/标准	否
已有能够报告9项全球非传染性疾病指标的非传染性疾病监测和监督系统	否
有全国性以人口为基础的癌症登记	否

\* 该国的死亡率估计数具有高度不确定性，这是因为没有以国家非传染性疾病死亡数据为基础（见解释性说明）。