

尼日利亚


人口总数: 169 000 000

收入分组: 中低


城市地区人口占比: 49.6%

30岁至70岁人口占比: 27.7%

年龄标准化死亡率*




死因构成比 (占所有死亡的%, 所有年龄组, 两性)*



死亡总数: 2,083,000
非传染性疾病估计占所有死亡的 24%.

非传染性疾病导致的过早死亡*

30岁至70岁期间死于4种主要的非传染性疾病的概率为 20% .



成人危险因素

目前吸烟(2011)

男性 女性 合计

10% 2% 6%

人均酒精总消费量, 纯酒精升数(2010)

14.9 5.1 10.1

高血压(2008)

33.5% 36.1% 34.8%

肥胖症(2008)

4.6% 8.4% 6.5%

国家系统应对非传染性疾病

卫生部或同等部委设有科室/部门或司局负责非传染性疾病

否

已实行针对多个非传染性疾病和共同危险因素的国家多部门政策、战略或行动计划

否

已实行旨在减少有害使用酒精的政策、战略或行动计划

否

已实行旨在减少缺乏运动和/或促进运动的政策、战略或行动计划

否

已实行旨在减轻烟草使用负担的政策、战略或行动计划

否

已实行旨在减少不健康饮食和/或促进健康饮食的政策、战略或行动计划

否

已有通过初级保健方法管理主要非传染性疾病的国家循证指南/规程/标准

否

已有能够报告9项全球非传染性疾病指标的非传染性疾病监测和监督系统

是

有全国性以人口为基础的癌症登记

否

* 该国的死亡率估计数具有高度不确定性, 这是因为没有以国家非传染性疾病死亡数据 为基础
(见解释性说明).