


葡萄牙


人口总数: 10 604 000  
收入分组: 高

城市地区人口占比: 61.1%  
30岁至70岁人口占比: 54.8%

年龄标准化死亡率



死因构成比（占所有死亡的%，所有年龄组，两性）




死亡总数: 97,000  
非传染性疾病估计占所有死亡的 86%.


非传染性疾病导致的过早死亡

30岁至70岁期间死于4种主要的非传染性疾病的风险为 12% .

70岁以下死亡人数  
男性



70岁以下死亡人数  
女性



成人危险因素

|                       | 男性    | 女性    | 合计    |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| 目前吸烟(2011)            | 30%   | 15%   | 22%   |
| 人均酒精总消费量，纯酒精立升数(2010) | 18.7  | 7.6   | 12.9  |
| 高血压(2008)             | 38.2% | 31.2% | 34.5% |
| 肥胖症(2008)             | 21.6% | 26.3% | 24.0% |

国家系统应对非传染性疾病

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 卫生部或同等部委设有科室/部门或司局负责非传染性疾病           | 是 |
| 已实行针对多个非传染性疾病和共同危险因素的国家多部门政策、战略或行动计划 | 是 |
| 已实行旨在减少有害使用酒精的政策、战略或行动计划             | 是 |
| 已实行旨在减少缺乏运动和/或促进运动的政策、战略或行动计划        | 是 |
| 已实行旨在减轻烟草使用负担的政策、战略或行动计划             | 是 |
| 已实行旨在减少不健康饮食和/或促进健康饮食的政策、战略或行动计划     | 是 |
| 已有通过初级保健方法管理主要非传染性疾病的国家循证指南/规程/标准    | 是 |
| 已有能够报告9项全球非传染性疾病指标的非传染性疾病监测和监督系统     | 否 |
| 有全国性以人口为基础的癌症登记                      | 是 |