

# 瑞典


人口总数: 9 511 000

收入分组: 高


城市地区人口占比: 85.2%

30岁至70岁人口占比: 50.9%

## 年龄标准化死亡率





## 死因构成比 (占所有死亡的%, 所有年龄组, 两性)



死亡总数: 91,000  
非传染性疾病估计占所有死亡的 90%。

## 非传染性疾病导致的过早死亡

30岁至70岁期间死于4种主要的非传染性疾病的概率为 10%。



## 成人危险因素

|                        | 男性    | 女性    | 合计    |
|------------------------|-------|-------|-------|
| 目前吸烟(2011)             | 25%   | 24%   | 24%   |
| 人均酒精总消费量, 纯酒精立升数(2010) | 12.9  | 5.5   | 9.2   |
| 高血压(2008)              | 34.9% | 26.8% | 30.8% |
| 肥胖症(2008)              | 19.9% | 17.3% | 18.6% |

## 国家系统应对非传染性疾病

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 卫生部或同等部委设有科室/部门或司局负责非传染性疾病           | 是 |
| 已实行针对多个非传染性疾病和共同危险因素的国家多部门政策、战略或行动计划 | 否 |
| 已实行旨在减少有害使用酒精的政策、战略或行动计划             | 是 |
| 已实行旨在减少缺乏运动和/或促进运动的政策、战略或行动计划        | 是 |
| 已实行旨在减轻烟草使用负担的政策、战略或行动计划             | 是 |
| 已实行旨在减少不健康饮食和/或促进健康饮食的政策、战略或行动计划     | 是 |
| 已有通过初级保健方法管理主要非传染性疾病的国家循证指南/规程/标准    | 是 |
| 已有能够报告9项全球非传染性疾病指标的非传染性疾病监测和监督系统     | 否 |
| 有全国性以人口为基础的癌症登记                      | 是 |