

布隆迪

2010年人口总数： 8 382 849

收入分组： 低

非传染性疾病死亡率*

2008年估计数	男性	女性
非传染性疾病死亡总数（千）	12.2	17.2
60岁以下非传染性疾病死亡数 （所有非传染性疾病死亡的百分比）	47.1	43.4
每10万人口年龄标化死亡率		
所有非传染性疾病	837.3	828.1
癌症	105.3	108.8
慢性呼吸系统疾病	119.9	75.7
心血管疾病和糖尿病	437.5	488.5


行为危险因素

2008年估计流行率（%）	男性	女性	合计
目前经常吸烟	...	...	...
缺乏运动	...	...	...

代谢性危险因素


2008年估计流行率（%）	男性	女性	合计
血压升高	...	...	...
血糖升高	...	...	...
超重	...	...	...
肥胖	...	...	...
胆固醇升高	...	...	...

死因构成比（占有所有死亡的%，所有年龄组）*



非传染性疾病估计占有所有死亡的 26%。

代谢性危险因素发展趋势



国家处理和应对非传染性疾病的能力

卫生部设有科室/部门/司局负责非传染性疾病	是	有综合性或者特定主题的政策/规划/行动计划，目前用于：	
有资金用于：		心血管疾病	否
非传染性疾病治疗与控制	否	癌症	否
非传染性疾病预防与健康促进	否	慢性呼吸系统疾病	否
非传染性疾病监测、监督和评价	否	糖尿病	否
		酒精	否
国家卫生报告系统包括：		不健康饮食/超重/肥胖	否
非传染性疾病死因别死亡率	否	缺乏运动	否
非传染性疾病发病率	是	烟草	否
非传染性疾病危险因素	否		
有全国性以人口为基础的癌症登记	否	取得最高实施程度的烟草 (m)POWER措施数目	0/5

* 该国的死亡率估计数具有高度不确定性，这是因为没有以国家非传染性疾病死亡数据为基础，估计数字的基础是结合了国家生命表、死因模式、区域死因模式以及世卫组织和联合国艾滋病规划署对某些主要死因（不包括非传染性疾病）的规划估计数。

... = 没有可用数据