

# 阿尔及利亚

2010年人口总数： 35 468 208

收入分组：中高

## 非传染性疾病死亡率\*

	男性	女性
2008年估计数		
非传染病疾病死亡总数（千）	53.5	55.5
60岁以下非传染性疾病死亡数 (所有非传染性疾病死亡的百分比)	32.8	28.6
每10万人口年龄标准化死亡率		
所有非传染性疾病	556.0	472.4
癌症	97.7	79.2
慢性呼吸系统疾病	74.7	38.9
心血管疾病和糖尿病	278.6	275.0


## 行为危险因素

	男性	女性	合计
2008年估计流行率 (%)			
目前经常吸烟	24.8	0.2	12.5
缺乏运动	30.8	47.6	39.2

## 代谢性危险因素




	男性	女性	合计
2008年估计流行率 (%)			
血压升高	38.3	37.6	38.0
血糖升高	7.9	8.2	8.0
超重	39.1	51.8	45.5
肥胖	9.6	22.4	16.0
胆固醇升高	36.6	40.5	38.5

## 死因构成比（占所有死亡的%，所有年龄组）\*



非传染性疾病估计占所有死亡的 63%.

## 代谢性危险因素发展趋势



是	有综合性或者特定主题的政策/规划/行动计划，目前用于：	是**
	心血管疾病	是**
是	癌症	是**
是	慢性呼吸系统疾病	是**
是	糖尿病	是**
	酒精	否
	不健康饮食/超重/肥胖	是**
否	缺乏运动	是**
否	烟草	是**
否	取得最高实施程度的烟草 (m)POWER措施数目	0/5

\* 该国的死亡率估计数具有高度不确定性，这是因为没有以国家非传染性疾病死亡数据为基础。估计数字的基础是结合了国家生命表、死因模式、区域死因模式以及世卫组织和联合国艾滋病规划署对某些主要死因（不包括非传染性疾病）的规划估计数。

\*\* = 由综合性政策/规划/行动计划覆盖