

几内亚比绍

2010年人口总数: 1 515 224

收入分组: 低

非传染性疾病死亡率*

2008年估计数	男性	女性
非传染性疾病死亡总数 (千)	3.5	3.8
60岁以下非传染性疾病死亡数 (所有非传染性疾病死亡的百分比)	47.1	44.9
每10万人口年龄标准化死亡率		
所有非传染性疾病	944.6	874.0
癌症	90.4	97.8
慢性呼吸系统疾病	139.8	83.0
心血管疾病和糖尿病	502.4	523.3


行为危险因素

2008年估计流行率 (%)	男性	女性	合计
目前经常吸烟
缺乏运动

代谢性危险因素

2008年估计流行率 (%)	男性	女性	合计
血压升高
血糖升高
超重
肥胖
胆固醇升高


死因构成比 (占有所有死亡的%, 所有年龄组)*




非传染性疾病估计占有所有死亡的 28%。

代谢性危险因素发展趋势


平均收缩压




平均体重指数



平均空腹血糖



平均总胆固醇



国家处理和应对非传染性疾病的能力

卫生部设有科室/部门/司局负责非传染性疾病
有资金用于:

- 非传染性疾病治疗与控制
- 非传染性疾病预防与健康促进
- 非传染性疾病监测、监督和评价

国家卫生报告系统包括:

- 非传染性疾病死因别死亡率
- 非传染性疾病发病率
- 非传染性疾病危险因素

有全国性以人口为基础的癌症登记

是	有综合性或者特定主题的政策/规划/行动计划, 目前用于:	
否	心血管疾病	否
否	癌症	否
否	慢性呼吸系统疾病	否
否	糖尿病	否
	酒精	否
	不健康饮食/超重/肥胖	否
是	缺乏运动	否
是	烟草	否
否	取得最高实施程度的烟草 (m)POWER措施数目	0/5

* 该国的死亡率估计数具有高度不确定性, 这是因为没有以国家非传染性疾病死亡数据为基础, 估计数字的基础是结合了国家生命表、死因模式、区域死因模式以及世卫组织和联合国艾滋病规划署对某些主要死因 (不包括非传染性疾病) 的规划估计数。

... = 没有可用数据