

尼日利亚

2010年人口总数： 158 423 182

收入分组：中低

非传染性疾病死亡率*

	男性	女性
2008年估计数		
非传染病疾病死亡总数（千）	254.6	285.2
60岁以下非传染性疾病死亡数 (所有非传染性疾病死亡的百分比)	41.5	41.8
每10万人口年龄标准化死亡率		
所有非传染性疾病	818.2	792.6
癌症	89.4	98.8
慢性呼吸系统疾病	119.0	71.6
心血管疾病和糖尿病	435.9	475.7


行为危险因素

	男性	女性	合计
2008年估计流行率 (%)			
目前经常吸烟	7.6	1.7	4.6
缺乏运动

代谢性危险因素





	男性	女性	合计
2008年估计流行率 (%)			
血压升高	41.5	44.0	42.8
血糖升高	6.9	10.0	8.5
超重	24.2	29.3	26.8
肥胖	4.6	8.4	6.5
胆固醇升高	13.6	18.5	16.1

死因构成比（占所有死亡的%，所有年龄组）*



非传染性疾病估计占所有死亡的 27%.

代谢性危险因素发展趋势



国家处理和应对非传染性疾病的能力

卫生部设有科室/部门/司局负责非传染性疾病
有资金用于：

- 非传染性疾病治疗与控制
- 非传染性疾病预防与健康促进
- 非传染性疾病监测、监督和评价

国家卫生报告系统包括：

- 非传染性疾病死因别死亡率
- 非传染性疾病发病率
- 非传染性疾病危险因素

有全国性以人口为基础的癌症登记

是	有综合性或者特定主题的政策/规划/行动计划，目前用于：	是**
是	心血管疾病	是**
是	癌症	是**
是	慢性呼吸系统疾病	是**
是	糖尿病	是**
是	酒精	是**
是	不健康饮食/超重/肥胖	是**
是	缺乏运动	是**
否	烟草	是**
	取得最高实施程度的烟草 (m)POWER措施数目	0/5

* 该国的死亡率估计数具有高度不确定性，这是因为没有以国家非传染性疾病死亡数据为基础。估计数字的基础是结合了国家生命表、死因模式、区域死因模式以及世卫组织和联合国艾滋病规划署对某些主要死因（不包括非传染性疾病）的规划估计数。

... = 没有可用数据

** = 由综合性政策/规划/行动计划覆盖