

巴布亚新几内亚

2010年人口总数： 6 858 266

收入分组： 中低

非传染性疾病死亡率*

2008年估计数	男性	女性
非传染性疾病死亡总数 (千)	11.1	9.1
60岁以下非传染性疾病死亡数 (所有非传染性疾病死亡的百分比)	49.1	48.4
每10万人口年龄标准化死亡率		
所有非传染性疾病	836.9	664.7
癌症	151.8	106.9
慢性呼吸系统疾病	99.9	74.1
心血管疾病和糖尿病	459.8	395.4


行为危险因素

2008年估计流行率 (%)	男性	女性	合计
目前经常吸烟	56.9	24.8	40.9
缺乏运动	14.1	18.1	16.1

代谢性危险因素





2008年估计流行率 (%)	男性	女性	合计
血压升高	29.4	24.6	27.0
血糖升高	13.4	13.2	13.3
超重	45.3	51.2	48.3
肥胖	11.7	20.6	16.2
胆固醇升高	36.1	37.5	36.8

死因构成比 (占有所有死亡的%, 所有年龄组) *



非传染性疾病估计占有所有死亡的 44%。

代谢性危险因素发展趋势



国家处理和应对非传染性疾病的能力

卫生部设有科室/部门/司局负责非传染性疾病
有资金用于:

- 非传染性疾病治疗与控制
- 非传染性疾病预防与健康促进
- 非传染性疾病监测、监督和评价

国家卫生报告系统包括:

- 非传染性疾病死因别死亡率
- 非传染性疾病发病率
- 非传染性疾病危险因素

有全国性以人口为基础的癌症登记

是	有综合性或者特定主题的政策/规划/行动计划, 目前用于:	
是	心血管疾病	是**
是	癌症	是**
是	慢性呼吸系统疾病	否
是	糖尿病	是**
	酒精	是**
	不健康饮食/超重/肥胖	是**
	缺乏运动	是**
	烟草	是**
DK	取得最高实施程度的烟草 (m)POWER措施数目	0/5

* 该国的死亡率估计数具有高度不确定性, 这是因为没有以国家非传染性疾病死亡数据为基础, 估计数字的基础是结合了国家生命表、死因模式、区域死因模式以及世卫组织和联合国艾滋病规划署对某些主要死因 (不包括非传染性疾病) 的规划估计数。

** = 由综合性政策/规划/行动计划覆盖
DK = 国家回答“不知道”