

中国



总人口: 1390000000

收入组: 中高收入



死亡总数: 9,846,000

出生时预期寿命: 平均:75 男性:74 女性:77

癌症死亡概况



年龄标准化癌症死亡趋势



癌症发病



成人危险因素

	男性	女性	平均
现在吸烟率 (2011)	46.9%	2.1%	25.1%
人均酒精消费量折合为纯酒精总升数 (2010)	10.9	2.2	6.7
缺乏身体活动 (2010)	22.2%	25.4%	23.8%
肥胖症 (2014)	6.2%	8.5%	7.3%
家庭使用固体燃料 (2012)	-	-	45.0%

防癌计划，监督和监测

已实施防癌政策/战略/行动计划	是
有癌症登记簿	是
范围	以人群为基础
覆盖面	全国性
数据来源年度	2009

癌症一级预防政策

烟草控制

已实施减少烟草使用负担的政策、战略或行动计划	是
无烟立法	一或两类公共场所完全禁烟
烟草依赖治疗	尼古丁替代疗法和/或一些戒烟服务（两种的费用均不覆盖）
警语标签	缺失一些适当特征的中等大小的警语或者缺失许多适当特征的大幅警语
禁止广告、促销和赞助	禁止在国家电视台、电台和平面媒体做广告并禁止一些但不是所有形式的直接和/或间接广告
烟草税	税占零售价格26-50%

预防和控制超重和肥胖症

已实施减少超重/肥胖的政策、战略或行动计划	是
-----------------------	---

预防和控制缺乏身体活动现象

已实施减少缺乏身体活动并/或促进身体活动的政策、战略或行动计划	是
---------------------------------	---

预防和控制有害使用酒精

已实施减少有害使用酒精的政策、战略或行动计划	是
------------------------	---

国家免疫接种

人乳头瘤病毒免疫接种时间表	...
乙肝病毒免疫接种时间表	出生，+间隔1个月，+间隔6个月
乙肝病毒免疫接种覆盖率，婴儿	99%

癌症筛查与早期发现

宫颈癌

宫颈细胞学检查（PAP）	公立初级卫生保健机构可普遍获得
醋酸肉眼观察法（VIA）	公立初级卫生保健机构可普遍获得

乳腺癌

乳腺触诊/临床乳腺检查	公立初级卫生保健机构可普遍获得
乳房X光检查	公立初级卫生保健机构可普遍获得

结肠直肠癌

粪便潜血试验或粪便免疫试验	公立初级卫生保健机构可普遍获得
通过检查或结肠镜检查进行肠癌筛查	公立初级卫生保健机构可普遍获得

癌症治疗和姑息治疗

放疗	不能在公共卫生系统普遍获得
每百万居民高能远距放射治疗仪数量	1.1
放疗中心数量	1105
放射肿瘤科医生数量	7121
化疗（不限药品）	不能在公共卫生系统普遍获得
口服吗啡（不限配方）	公共卫生系统可普遍获得
每例癌症死亡患者吗啡当量消耗量（不包括美沙酮）（mg）	...
晚期癌症和其他非传染性疾病患者社区/家庭护理	不能普遍获得

... = 无数据